

Contrastextravasatie
Dienst Radiologie

Wij wensen u alvast een spoedig herstel!

De artsen en medewerkers
van Radiologie

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER



Algemeen Ziekenhuis Diest
Statiestraat 65 – 3290 Diest
t 013 35 43 23 – f 013 31 34 53
post@azdiest.be – www.azdiest.be

©Algemeen Ziekenhuis Diest
Februari 2020

Algemeen Ziekenhuis Diest
Dienst Radiologie
Statiestraat 65 – 3290 Diest - 013 35 40 20
www.azdiest.be

WAT IS CONTRASTEXTRAVASATIE

U heeft zojuist een onderzoek met contrast ondergaan op de CT of NMR. Hierbij werd contrastvloeistof via een infuus in uw bloedbaan gespoten. Contrastvloeistof zorgt ervoor dat bloedvaten en organen duidelijker worden afgebeeld op de foto's.

Tijdens de injectie kwam een deel van de contrastvloeistof buiten het bloedvat en onder de huid terecht. Dit heet contrastextravasatie.

In deze brochure zal u meer informatie krijgen over de symptomen en de behandeling.

SYMPTOMEN

Nadat de contrastvloeistof buiten uw bloedbaan terechtgekomen is, zijn er een aantal symptomen die wijzen op extravasatie:

- Pijn of brandend gevoel
- Harde, rode pijnlijke zwelling op de insteekplaats
- Verkleuring van de huid

Vaak hebben patiënten hier weinig tot geen last van.

Het lichaam zal de contrastvloeistof zelf afvoeren. De zwelling verdwijnt dan meestal binnen de 2 tot 4 dagen maar soms kunnen de klachten ook een week aanhouden.

RESTLETSELS

De meeste extravasaties zijn beperkt tot de onderhuidse weke delen en huid. Normaal gezien is er geen restletsel.

De pijnlijke reactie duurt normaal gezien minder dan 24 tot 48 uur.

EVALUATIE

De ernst en het volume wordt beoordeeld en indien nodig wordt er een röntgenfoto van de extravasatieplaats genomen.

BEHANDELING

Om de genezing te bevorderen zijn er een aantal tips waarmee u rekening kan houden:

- Hou de arm in hoogstand wanneer u zit of ligt. Zorg dat hierbij de bloedvaten niet afgekneld worden door bijvoorbeeld te strakke kleding.
- Maak regelmatig knijpbewegingen met uw hand. Dit zorgt voor een betere afvoer van het extravasaat.
- Het is aangeraden om enkele keren per dag koude (ijs)compressen op de zwelling te leggen om ze te verminderen tot men symptoomvrij is. U kan de compressen eenvoudig zelf maken door ijsblokjes in een plastic zakje te doen. Wikkel ze in een droge handdoek of droog washandje en houd dit tegen de zwelling. Koel niet langer dan een kwartier en wacht minimaal een half uur voordat u weer gaat koelen

Als u tintelingen, verkramping of doofheid in uw vingers voelt, neemt u best contact op met uw huisarts.

Contactgegevens Radiologie

radiologie@azdiest.be
013 35 40 20

Meer info:
www.azdiest.be/medische-diensten/radiologie