

Ontslag uit het ziekenhuis

Na de controle door de NKO-arts mag uw kind, wanneer het drinken goed gaat en hij/zij niet braakt of er geen bloeding optreedt, het ziekenhuis verlaten. Indien nodig krijgt u een voorschrift mee voor (pijn)medicatie.

Nazorg

Gedurende 1 week zal uw kind klagen van erge keelpijn en zal het moeilijk kunnen eten. Meestal treedt de ergste pijn 2 tot 3 dagen na de ingreep op.

Tegen deze pijn kan u paracetamol (zoals Perdolan®, Dafalgan®) of Nurofen® geven. Gebruik GEEN aspirine (zoals Aspégic®) owv het bloedingsrisico!

Veel drinken van koud water kan de pijn verlichten. Vermijd de eerste week te warme maaltijden of dranken en een te warm bad. Dit verhoogt de kans op nabloeding.

Op de plaats waar de amandelen zaten, vormt zich een grijswitte korst waardoor de adem slecht kan ruiken. Dit wijst niet op een infectie. De korst zal na 7 tot 8 dagen loskomen en spontaan verdwijnen.

Bij bloeding uit neus of mond en koorts boven de 38°C neemt u best **onmiddellijk** contact op met uw NKO-arts of met de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of twijfels uw NKO-arts te raadplegen.

Controle

Na drie tot vier weken verwachten we u voor een controleconsultatie. Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt hiervoor een datum vastgelegd.



Een dagje in het ziekenhuis:



Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe



**Tonsillectomie:
Verwijderen van de keelamandelen**

Algemeen Ziekenhuis Diest
Dienst KNO – pediatrie – chirurgisch dagcentrum
Statiestraat 65 – 3290 Diest – t 013 35 40 11

Beste ouder(s),

Bij uw kind zal binnenkort een heelkundige ingreep worden uitgevoerd waarbij de keelamandelen worden verwijderd. De ingreep vindt plaats onder algemene narcose.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neus- keel- oorzaken

SECRETARIAAT NKO 013/35 41 22

Dr. Bruninx – Dr. Corvers – Dr. Verguts

Dr. Van Valckenborgh 013/35 41 22
016/40 17 30

Wij wensen u een aangenaam verblijf op de afdeling en een spoedig herstel.



Wat zijn “de amandelen” en wat is hun functie?

Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het zogenaamde lymfoïd systeem. De overgang van de mond en neus naar de keel bevat veel van dit weefsel. Het vormt een soort ring om zoveel mogelijk binnendringende ziektekiemen onschadelijk te maken. Dit lymfoïd weefsel bevindt zich op 3 plaatsen:


1. In de neus-keelholte

Dit is de ruimte achter de neus boven het zachte verhemelte. Het verdikte lymfeklierweefsel in het dak van de neus noemt men neusamandel. (adenoïd-poliep) De neusamandel is bij jonge kinderen aanwezig en vanaf het achtste levensjaar neemt de grootte af. Uitzonderlijk blijft de neusamandel bestaan op volwassen leeftijd.

2. In de keel

De keelamandelen (tonsillen) zijn zichtbaar als knobbels links en rechts achteraan in de keel.

1. Neusamandel en
2. Keelamandel en



3. Achter op de tong

Klachten en behandeling

Bij een acute ontsteking van de keelamandelen bestaan de klachten in het algemeen uit een korte periode van keelpijn met slikklachten, koorts en algemeen ziek zijn. Dergelijke perioden kunnen zich meermaals per jaar voordoen.

Wanneer het onvoldoende lukt om de klachten met medicatie (pijnstillers en/of antibiotica) te bestrijden, of als er te vaak medicatie moet worden gebruikt, kan het verstandig zijn om de amandelen weg te nemen. Soms zal hierbij ook de neusamandel verwijderd worden.

De operatie

De ingreep gebeurt onder een algemene verdoving tijdens een dagopname. De amandelen worden meestal verwijderd door ze stapsgewijs los te maken ('pellen').

Na de operatie

Na de ingreep verblijft uw kind nog ongeveer een half uur in de ontwaakruimte

Uw kind kan keelpijn hebben en moeite met slikken. Deze pijn kan uitstralen naar de oren. Tijdens de ingreep wordt hiervoor reeds een pijnstiller toegediend.

Meestal komt wat vers bloed uit de keel of wordt wat donker bloed uitgebraakt. Dit is oud bloed dat tijdens de ingreep in de maag kwam.

Na de operatie moet uw kind enkele uren nuchter blijven. De verpleegkundige deelt het tijdstip dat hij/zij mag drinken mee. Het infuus dat werd geplaatst dient om de periode van niet eten en drinken te overbruggen. Het wordt pas verwijderd wanneer u naar huis gaat.