

Na de operatie

Uw kind mag het ziekenhuis verlaten na controle door de NKO-arts. Indien nodig krijgt u een voorschrift mee voor oordruppels.

Er hoeven geen speciale maatregelen te worden genomen. Na zes maanden tot ruim een jaar na de operatie groeit het trommelvliesbuisje uit het trommelvlies. Het belandt zo in de gehoorgang en vindt spontaan zijn weg naar buiten. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich vrijwel altijd vanzelf.

Uw kind mag de eerste 14 dagen niet onder water zodat de buisjes goed kunnen vast groeien. Na de controle kan dit wel. Diep duiken tijdens het zwemmen en contact met zeep of shampoo zijn te vermijden. U kunt voor het wassen even de gehoorgang afsluiten met een vet wattenpropje.

Controle

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt een afspraak vastgelegd voor een eerste controleconsultatie.

Pijn

De dag van de operatie kan uw kind pijn voelen.

Tegen deze pijn kan u paracetamol (zoals Perdolan[®], Dafalgan[®]) of Nurofen[®] geven. Gebruik GEEN aspirine (zoals Aspégic[®])

Verwikkelingen

Het kan gebeuren dat het oor wat vochtverlies vertoont. Dat is nooit erg, maar het is wel verstandig om de NKO-arts binnen een week naar het oor te laten kijken. Hij/zij kan de gehoorgang en het buisje reinigen.



Een dagje in het ziekenhuis:



Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe



Plaatsen van Trommelvliesbuisjes

Algemeen Ziekenhuis Diest
Dienst NKO – pediatrie – chirurgisch dagcentrum
Statiestraat 65 – 3290 Diest – t 013 35 40 11

Beste ouder(s),

Bij uw kind zal binnenkort een heelkundige ingreep worden uitgevoerd waarbij trommelvliesbuisjes worden geplaatst. De ingreep vindt plaats onder algemene narcose.

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is – vooral bij kinderen – één van de meest voorkomende chirurgische ingrepen.

Met deze folder willen wij u de nodige informatie geven om u en uw kind zo goed mogelijk op de operatie voor te bereiden en die zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neus- keel- oorzaken

SECRETARIAAT NKO 013/35 41 22

Dr. Bruninx – Dr. Corvers – Dr. Verguts


Dr. Van Valckenborgh 013/35 41 22

016/40 17 30



Werking van het gehoororgaan

- **De uitwendige gehoorgang**
- **Het trommelvlies** met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes. Het middenoor staat in verbinding met de neus-keelholte via de buis van Eustachius.
- **Het eigenlijke gehoororgaan**, ook wel het slakkenhuis genoemd.



Geluiden komen door de gehoorgang het oor binnen. Aan het eind van de gehoorgang, op de grens met het middenoor, is het trommelvlies uitgespannen.

Door geluid gaat het trommelvlies trillen. Die trillingen worden via de gehoorbeentjes doorgegeven aan het slakkenhuis.

Het goed functioneren van het trommelvlies is afhankelijk van de luchtdruk en van de slijmproductie in het middenoor.

De buis van Eustachius regelt de luchtdruk en de afvoer van slijm. Een te lage druk remt het soepel trillen van het trommelvlies af. Dit veroorzaakt eveneens een overproductie aan slijm.

Klachten en behandeling

Als de buis van Eustachius niet goed werkt, vermindert het gehoor. Bovendien ontstaat er soms pijn of een drukgevoel in het oor en is er meer risico op middenoorontsteking. Vaak geneest dit spontaan, maar bij sommige kinderen blijft het gehoorverlies aanslepen, zijn er recidiverende otitiden of ontwikkelt zich een duidelijk gehoorsverlies interfererend met taal en spraakontwikkeling. Deze kinderen lijken dan wat onoplettend te zijn, meer te roepen of op school minder te presteren.

Als medicatie niet (meer) helpt, wordt een trommelvliesbuisje geplaatst in één of in beide oren. Dit is een klein kunststof buisje dat in het trommelvlies wordt geplaatst en de functie van de buis van Eustachius overneemt.

Samen met de verminderde werking van de buis van Eustachius stelt men vaak een vergroting en/of ontsteking van de neusamandel vast, die ook wel adenoid of poliep wordt genoemd.

Het adenoid wordt tijdens dezelfde ingreep gecontroleerd en eventueel verwijderd. Na de ingreep verdwijnen de klachten.

De Operatie

De ingreep gebeurt bij kinderen onder een korte algemene verdoving tijdens een dagopname. Wanneer het kind onder narcose is, wordt een kleine snede gemaakt in het trommelvlies. Het slijm wordt uit het middenoor afgezogen. In de snede wordt het buisje geplaatst.

Na de ingreep verblijft uw kind nog ongeveer een half uur in de ontwaakruimte. Het heeft dan geen oorpijn. Soms komt er wel wat vocht, bloed of een teveel aan oordruppels uit het oor.