

Te verwachten:

1. Zwelling aan de geopereerde kant. Dit zal toenemen tot 3 dagen na de ingreep en daarna geleidelijk aan afnemen.
2. Napijn is normaal en kan tot 3 weken na de ingreep duren.
3. Nabloeden is de eerste 12 à 24u mogelijk. Bij nabloeden bijt U een halfuur dicht op een opgerolde zakdoek.
4. De hechtingen verdwijnen na een tien dagen tot drie weken vanzelf. Bij hinder mogen ze uitgehaald worden bij de tandarts.



Apexresectie


Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie

Algemeen Ziekenhuis Diest
Dienst Stomatologie- MKA
Hasseltsestraat 29 – 3290 Diest
t 013 35 40 64 of 013 35 40 80
secr.stomatologie@azdiest.be

Algemeen Ziekenhuis Diest
Dienst Stomatologie- MKA
Hasseltsestraat 29 – 3290 Diest
t 013 35 40 64 of 013 35 40 80

Vorbereiding

1. U moet niet nuchter zijn voor de ingreep.
2. Het is belangrijk uw tanden voor de ingreep te poetsen. Dit vermindert kans op infectie.
3. De arts voert nog een klein mondonderzoek uit, raadpleegt uw dossier en bekijkt ook uw OPG.
4. Vervolgens gaat de arts de plaats van de ingreep lokaal verdoven. Er is meer een beperkt gebied verdoofd. In de onderkaak zijn ook uw tong en lip verdoofd. Let erop dat U in die periode niet op uw wang, tong of lippen bijt.



De ingreep

De bedoeling van een apexresectie is tweevoudig.

Hoofdzakelijk zal het infectieweefsel verwijderd worden. dit weefsel tast het bot aan, en kan druk, fistelvorming en eventueel beschadiging van buurtanden of de kaakzenuw veroorzaken.

Het infectieweefsel neemt dikwijls de vorm aan van een cyste, die zich gewoonlijk dicht bij de punt van de wortel bevindt. Het verwijderen van infectieweefsel gebeurt via een kleine incisie.

Met een klein boortje gaan we naar het ontstekingsweefsel. Dit weefsel of de cyste wordt grondig gecuretteerd. De wortel wordt ingekort. En indien mogelijk wordt in het wortelpuntje een kleine vulling geplaatst. Hierna wordt de wonde gespoeld en dichtgemaakt met oplosbare hechtingen.

Nazorg

Na de ingreep geeft de chirurg U informatie i.v.m. medicatie en eventuele controle. U krijgt de nodige medicatie voorgeschreven.

De dag van de operatie

1. Neem pijnstillers voor de verdoving is uitgewerkt en wacht niet totdat de pijn optreedt.
2. Zwelling verminderen door ijskompresen tegen uw wang te houden. Eet ook enkel koude of lauwe maaltijden en eet wanneer de verdoving uitgewerkt is.
3. Om de kans op nabloeden te verminderen mag U uw mond de dag van de ingreep niet spoelen. Indien er een nabloeding moest zijn, bijt U gedurende 30 minuten toe op een kompres of stoffen zakdoek.

Voor de volgende dagen

1. Mondhygiëne is belangrijk om infecties te voorkomen. Goed poetsen is heel belangrijk
2. 24u na de ingreep mag U uw mond, na het poetsen, spoelen met een mondspoelmiddel. Dit doet U twee keer per dag.
3. Neem de pijnmedicatie zoals voorgeschreven
4. Rook niet gedurende vier dagen na de ingreep. Roken kan kans geven op een pijnlijke infectie van de wonde.
5. Indien U niet gerust bent, kan U ons tijdens de kantooruren bellen op het nummer 013/354064 of 013/354080. Na de kantooruren, kan U terecht op de Spoedgevallendienst van AZ Diest.