

# Peri-operatief medicatiegebruik

- Algemene principes:**
1. Toegestane medicatie kan met één klein slokje water 's ochtends vroeg ingenomen worden.
  2. Diabetes: nuchter de dag van de ingreep, alle hypoglyciërende medicatie (oraal en subcutaan) te stoppen de dag van de ingreep.
  3. Wanneer de ingreep onder loco-regionale anesthesie doorgaat, wordt de perorale medicatie best volgens normaal schema doorgenomen met één klein slokje water tenzij anders geadviseerd door de chirurg.

## Medicatie dag van de ingreep in te nemen:

### Cardiovasculair:

- **$\beta$ -blokkers:** Bisoprolol, Emconcor, Isoten, Tenormin, Atenolol, Carvedilol, Kredex, Metoprolol, Seloken, Selozok, Nobiten, Inderal
- Antihypertensiva:**
  - Calcium-antagonisten: Amlor, Amlodipine, Tildiem, Motens, ...
  - Centrale  $\alpha_2$ -agonisten: Catapressan, Moxon, Estulic, ...
  - $\alpha$ -blokkers: Minipress, ...
- Anti-aritmica:** Cordarone, Rythmodan, Apcard, Tambocor, Sotalax, Sotalol, Flecainide, Rytmonorm
- Nitraten:** Cedocard, Nitripatch, ...
- Molsidomine:** Corvaton, Coruno, ...
- Asaflow, Cardio-aspirine**

### Gastro-intestinaal

- H<sub>2</sub>-antihistaminica:** Zantac, ...
- PPI:** Nexiam, Losec, Zurcale, Pantomed, ...
- Gastrokinetica:** Primperan, Litan, Motilium ...

### Pulmonair

- Inhalantia:**
  - B<sub>2</sub>-agonisten: Berotec, Ventolin, Serevent, Oxis, ...
  - Anticholinergica: Spiriva, Atrovent, ...
  - Steroïden: Pulmicort, Flixotide, ...
- Leucotriëen antagonist:** Montelukast
- Mucolytica en expectorantia:** Lysomucyl, ...

### Centraal zenuw stelsel

- Anti-epileptica:** Depakine, Tegretol, Diphantoïne, Keppra, Lamictal, ...  
Indien langdurig orale inname niet mogelijk, IV substitutie nodig
- Anti-Parkinson medicatie:** Prolopa, Sinemet, ...
- Myastenia Gravis:** Mestinon
- ADHD:** Rilatine, Strattera ...

### Hormonaal stelsel

- Corticosteroïden:** Normale dosis te continueren
- Selectieve oestrogenen-receptor modulatoren:** Tamoxifen, Nolvadex, ...  
Continueren indien in kader van borstcarcinoom behandeling
- Hypolipiërende middelen:** Lipitor, Crestor, Zocor, ...
- Thyroidhormoon:** Elthyron, Euthyrox, ...

### Psychotrope Medicatie

- Opioiden**
- Antipsychotica:** Haldol, Dogmatil, ...  
Continueren indien hoog risico op psychose.
- MAO-inhibitoren:** alleen continueren bij hoog risico psychische decompensatie of suicidaal gedrag. Steeds duidelijk vermelden op preopficke als deze doorgenomen werd.

### Varia

- **Anti-virale middelen**
- **Immuunsuppressie**